



საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

კოლხური ხრამული



კოლხური ხრამული

კოლხური ხრამული (*Capoeta sieboldi*; Steindachner, 1864), თევზი. მიეკუთვნება კობრისებრთა ოჯახს (*Cyprinidae*, Fleming, 1822). სიგრძე 50 სმ-მდე, მასა 2,5 კგ. მტკნარი წყლის თევზია, უპირატესობას ანიჭებს მდინარის მდოვრე დინებას და დამდგარი წყალსაცავების ქვაქვიშიან ადგილებს. საცხოვრებელ გარემოდ ირჩევს მდინარის ქვემო დინებას. სქესობრივ სიმწიფეს აღწევს 3–4 წლის ასაკში. მრავლდება ივნისიდან სექტემბრამდე; ნაყოფიერება – 2000–30000 ქვირითამდე. იკვებება წყალმცენარეებით, დეტრიტით, ზოობენტოსით, წვრილი თევზებითა და ქვირითით.

ბინადრობს დას. საქართვე. თითქმის ყველა მდინარეში (ჭოროხი, ჩაქვი, კინტრიში, ბზიფი, ფსოუ), ტბასა (პალიასტომი, შავნაბადა, ბებესირი, ამტყელი) და წყალსაცავში (ტყიბული, გუმათი და სხვ.), აგრეთვე თურქეთის წყლებში. სარეწაო მნიშვნელობა არა აქვს. შეტანილია საქართველოს „ნითელ ნუსხაში“. ბუნების დაცვის საერთაშ. კავშირის მიერ (IUCN) არ არის შეფასებული (NE). კავკასიის ენდემია.

ლიტ.: ნ ი ნ უ ა ნ., ჯ ა ფ თ შ ვ ი ლ ი ბ., ბ თ ტ ო რ ი შ ვ ი ლ ი ვ., საქართველოს თევზები, თბ., 2013; К а с и м о в А., Пресноводная фауна Кавказа, Баку, 1972; Э л а н и д з е Р., Ихтиофауна рек и озер Грузии, Тб., 1983.