



## საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

ქართული ენციკლოპედიის ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია

---

### მერქანი

მერქანი, ქსილემა (

მ-ს ფართოდ იყენებენ მანქანათმშენებლობასა და გემთმშენებლობაში, ავეჯის, მუს. ინსტრუმენტებისა და სხვ. წარმოებაში, აგრეთვე – ნედლეულად ცელულოზა-ქაღალდის წარმოებაში. მ-სგან ამზადებენ მრავალი დასახელების პროდუქციასა და ნაკეთობას.

საქართვე. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2017–22 წლებში ჩატარებული ტყის ეროვნ. აღრიცხვის შედეგების მიხედვით, ტყით დაფარული ფართობი, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ჩათვლით, 3 096 700 ჰა-ს, ანუ ქვეყნის მთლიანი ტერიტორიის 44.7%-ს შეადგენს. ტყის 98%-ზე მეტი ბუნებრივი წარმოშობისაა. საქართვე. ტყეებში გავრცელებული 130-მდე მერქნიანი სახეობიდან (ხეები და ბუჩქები), ხშირია წიფელი (25.6%), რცხილა (16.2%), მურყანი (8.7%), მუხა (7,1%), ნაძვი (7,1%), წაბლი (5,4%). მ-ის საერთო მარაგი შეადგენს 528,2 მლნ მ<sup>3</sup>-ს, წლიური საშუალო შემატება – 6მ<sup>3</sup>/ჰა-ზე, ხოლო ტყეების საერთო წლიური შემატება – 13,7 მლნ მ<sup>3</sup>-ს, ხელოვნურად გაშენებული ტყეების ფართობი საერთო ფართობის 2%-ზე ნაკლებია. ამ მხრივ აღსანიშნავია ფერდობები თბილ. გარშემო, სადაც დარგულია ძირითადად წიწვოვანი ხეები (ფიჭვი, კვიპაროსი, კედარი), ასევე ფიჭვნარი სურამის მისადგომებთან, წალკის ფიჭვნარი და სხვ.

**მ. მაჭავარიანი**

---